

平成24年度区立小学校・中学校の給食・牛乳の放射能測定結果

提供期間	品目	提供(採取)施設名	日数	摂取量(kg)	検査結果(Bq/kg)			給食及び牛乳1週間分の放射性セシウムによる内部被ばくの実効線量(μ Sv)
					ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	
7月17日(火曜)から20日(金曜)	給食	港南小学校	4	1.817	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.03053 μ Sv未満
	給食	三光小学校	4	1.876	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.03152 μ Sv未満
	給食	朝日中学校	4	2.327	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.05212 μ Sv未満
	牛乳	区立小学校	4	0.800	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.01344 μ Sv未満
	牛乳	区立中学校	4	0.800	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.01792 μ Sv未満
7月9日(月曜)から13日(金曜)	給食	青山小学校	5	2.116	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.03555 μ Sv未満
	給食	筈小学校	5	2.070	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.03478 μ Sv未満
	給食	高松中学校	5	2.732	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.0612 μ Sv未満
	牛乳	区立小学校	5	1.000	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.0168 μ Sv未満
	牛乳	区立中学校	5	1.000	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.0224 μ Sv未満
7月2日(月曜)から6日(金曜)	給食	赤坂小学校	5	2.220	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.03696 μ Sv未満
	給食	芝浦小学校	5	2.670	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.04486 μ Sv未満
	給食	六本木中学校	5	2.964	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.06639 μ Sv未満
	牛乳	区立小学校	5	1.000	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.0168 μ Sv未満
	牛乳	区立中学校	5	1.000	<0.7	<0.7	<0.7	0 ~ 0.0224 μ Sv未満
【検査期間の内部被ばくの実効線量累計値】 *区立小学校における平成24年6月4日から7月20日までの給食及び牛乳の放射性セシウムによる内部被ばくの実効線量(μ Sv)の合計 *同一の週に複数の給食を測定している場合は、最も高い数値のものを累計対象とします。【1mSv=1,000 μ Sv】					給食	34日分	0 ~ 0.00025884mSv未満	
					牛乳	34日分	0 ~ 0.00011424mSv未満	

*「<0.7」とあるのは、検出限界値未満であることを表し、放射性物質の値が「0Bq/kgから0.7Bq/kg未満」であることを表しています。

*厚生労働省の新基準では、食品から許容することのできる放射性セシウムの線量を年間1mSv(ミリシーベルト)としています。この値は、食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会の指標「年間1mSv」を超えないように設定されています。
[1mSv = 1,000 μ Sv]

*摂取量とは、当該の1週間で摂取した総量で算出しています。(小学校は中学年を基準としています。)

*内部被ばくの実効線量とは、給食・牛乳に含まれる放射性物質(セシウム134及びセシウム137)により、人体が受ける放射線の影響を示すものでシーベルト(Sv)で表します。(ヨウ素131は半減期が短く、新基準値の対象外のため、実効線量の算出は行いません。)

*測定結果が検出限界値(0.7Bq/kg)未満の場合、内部被ばくの実効線量はセシウム134、137が、それぞれ0から検出限界値(0.7Bq/kg)まで含まれていたと仮定して算出しています。

【給食及び牛乳にかかる1週間分の実効線量の算出方法】

※実効線量の換算係数は「緊急時における食品の放射能測定マニュアル(厚生労働省、平成14年3月)」を参照しています。

〔換算係数〕	対象	セシウム134 (μ Sv/Bq)	セシウム137 (μ Sv/Bq)	備考
	幼児	0.013	0.0097	保育園児の内部被ばくの実効線量算定に使用する換算係数。
	少年	0.014	0.010	小学生の内部被ばくの実効線量算定に使用する換算係数。
	青年	0.019	0.013	中学生の内部被ばくの実効線量算定に使用する換算係数。

●セシウム134:(検出値×摂取量×換算係数) + セシウム137:(検出値×摂取量×換算係数) = 実効線量